

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом председателя  
Комитета фармации  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

### Гастал

#### Торговое название

Гастал

#### Международное непатентованное название

Нет

#### Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания

#### Состав

Одна таблетка содержит

*активные вещества:* алюминия гидроксид - магния карбоната гель - 450 мг,  
магния гидроксид - 300 мг,

*вспомогательные вещества:* маннитол (Е421), сорбитол (Е420), лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, натрия цикламат, сахарин натрий, тальк, магния стеарат, ароматизатор-пеперминт.

#### Описание

Таблетки круглой формы с плоской поверхностью от белого до кремоватого цвета со скошенными краями.

#### Фармакотерапевтическая группа

Пищеварительный тракт и обмен веществ. Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности. Антациды. Комбинации препаратов алюминия, кальция и магния.

Код АТХ А02АD

#### Фармакологические свойства

Гастал - комбинированный антацидный препарат для приема внутрь. Гастал нейтрализует свободную хлористоводородную кислоту, что приводит к уменьшению пептической активности желудочного сока и устранению диспептических нарушений. Гастал благодаря сбалансированности двух

активных компонентов, входящих в его состав, способствует быстрому и длительному (в течение 2-х часов) действию препарата. Не вызывает вторичной гиперсекреции. Оказывает адсорбирующее и обволакивающее действие, уменьшая влияние повреждающих факторов на слизистую оболочку желудка.

### **Показания к применению**

- острый и хронический гастрит в фазе обострения
- острый гастродуоденит
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
- рефлюкс-эзофагит

### **Способ применения и дозы**

Таблетку следует постепенно рассасывать (не проглатывать целиком). Взрослым рекомендуется принимать 2 таблетки 3-5 раз в день через 1 час после приема пищи и вечером перед сном, суточная доза не более 8 таблеток. Длительность применения не более 2-х недель, по рекомендации врача может быть назначен другой режим дозирования!

Аналогичные дозы рекомендуются при изжоге, независимо от приема пищи. Дети от 6 до 12 лет - принимать половину дозы для взрослых.

### **Побочные действия**

#### ***Метаболизм и расстройства питания***

*Очень редко*

- гипермагниемия (с последующей гипотонией). Наблюдается после длительного введения гидроксида магния у пациентов с почечной недостаточностью

*Неизвестно*

- гипофосфатемия

#### ***Нарушения костно-мышечной и соединительной ткани***

*Неизвестно*

- остеомалация

#### ***Желудочно-кишечные расстройства***

*Неизвестно*

- тошнота, диарея, запор, боль в животе

#### ***Нарушения иммунной системы***

*Очень редко*

- аллергические реакции

### **Противопоказания**

- гиперчувствительность к компонентам препарата
- выраженные нарушения функции почек
- болезнь Альцгеймера
- гипофосфатемия

- детский возраст до 6 лет
- беременность
- непереносимость фруктозы, галактозы, дефицит лактазы или мальабсорбция глюкозы и галактозы

### **Лекарственные взаимодействия**

Гастал снижает и замедляет абсорбцию индометацина, салицилатов, аминазина, фенитоина, блокаторов H<sub>2</sub>-гистаминовых рецепторов, дигоксина, бета-адреноблокаторов, дифлунизала, изониазида, антибиотиков тетрациклинового и фторхинолонового ряда, непрямых антикоагулянтов, препаратов железа, барбитуратов, жирорастворимых витаминов (их следует принимать за 1 час до или через 2 часа после приема Гастала).

M-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие Гастала. Гастал усиливает действие леводопы и налидиксовой кислоты.

Гастал (гидроксид магния) может увеличивать выделение салицилатов.

### **Особые указания**

У пациентов с нарушенной функцией почек при длительном приеме препарата возможна гипермагниемия.

У маленьких детей применение гидроксида магния может вызвать гипермагниемия, особенно при наличии почечной недостаточности или обезвоживания.

Не рекомендуется длительное применение у больных со сниженной массой тела, у кормящих матерей и детей (старше 6 лет). С осторожностью назначать препарат больным с сахарным диабетом и лактазной недостаточностью, детям до 12 лет и массой тела менее 50 кг, пожилой возраст.

Не использовать препарат более двух недель без рекомендации врача. При длительном применении следует обеспечить достаточное поступление фосфора с пищей.

#### *Период лактации*

В период лактации не рекомендуется длительное применение препарата.

*Особенности влияния лекарственного препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Не влияет

### **Передозировка**

Не зарегистрировано симптомов острой передозировки.

Однако, прием препарата в более высоких дозах, чем указано в инструкции, вызывает усиление побочных действий препарата.

*Лечение:* отмена препарата, проведение симптоматической терапии.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 6 таблеток в контурной ячейковой упаковке из алюминиевой фольги и пленки поливинилхлоридной.

По 2, 5 или 10 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

**Срок хранения**

3 года

Не применять по истечении срока годности.

**Условия хранения**

Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Производитель**

Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Краков, Польша

**Владелец регистрационного удостоверения**

«Teva Pharmaceutical Polska Sp.z.o.o.», Варшава, Польша

*Наименование, адрес и контактные данные (телефон, электронный адрес) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства*

ТОО «ратиофарм Казахстан», 050059 (A15E2P), г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1, БЦ Нурлы-Тау, 5Б, 6 этаж. Телефон: (727)3251615; e-mail: [safety.kazakhstan@tevapharm.com](mailto:safety.kazakhstan@tevapharm.com); веб сайт: [www.teva.kz](http://www.teva.kz)